

# Sborník Oblastního muzea v Mostě



řada přírodovědná číslo 42

2025

# **Sborník Oblastního muzea v Mostě**

**řada přírodovědná, 42**

**2025**



**ISSN 1214 – 2573  
ISBN 978-80-85115-56-7**

*Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná*, uveřejňuje recenzované původní vědecké práce a krátké zprávy z geologie, botaniky, zoologie, recenze, personálie a informace z přírodovědeckého života především ze severozápadních Čech a přilehlých území.

Periodikum je zařazeno do Seznamu recenzovaných neimpaktivních periodik vydávaných v ČR platném pro rok 2015, který byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 28.11.2014.

Podrobné pokyny pro autory a další bližší informace o sborníku jsou dostupné online na webu muzea:

**<https://www.muzeummost.cz/cz/publikacni-cinnost>**.

Plné obsahy posledních čísel sborníku jsou k dispozici na adrese:

**<https://www.muzeummost.cz/sbornik-oblastniho-muzea-v-moste>**.

The journal *Sborník Oblastního muzea v Mostě, series naturae*, publish peer reviewed original scientific works and brief reports in geology, botany and zoology, and also book reviews and personalia especially joined to Northwestern Bohemia and adjacent areas.

Detailed instructions for authors and further information about the journal are available online on the museum's website: **<https://www.muzeummost.cz/cz/publikacni-cinnost>**.

The full contents of latest issues of the journal can be found at the following address:

**<https://www.muzeummost.cz/sbornik-oblastniho-muzea-v-moste>**.

**Sborník Oblastního muzea v Mostě,  
řada přírodovědná, číslo 42.**

Vydalo / Published by: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Místo vydání / Place of publication: Most

Náklad / Edition: 300 ks/pcs

**ISSN 1214 – 2573**

**ISBN 978-80-85115-56-7**

Toto číslo vyšlo / The issue was published on: 31. 12. 2025

Vytisknuto v / Printed in: TISKÁRNA K & B, s. r. o.



Obrázek na první straně obálky / The picture on the front cover:  
pavlovnie plstnatá / the Foxglove Tree (*Paulownia tomentosa*) (orig. Pavel Krásenský).

Adresa redakce / The redaction address: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Čsl. armády 1360/35,  
434 01 Most; E-mail: [joza.v@omgm.cz](mailto:joza.v@omgm.cz); Telefon / The phone number: +420 414 120 238 (Vít Joza)

Redakční rada / Editorial board: Ing. Vít Joza (výkonný redaktor / Editor-in-chief), Pavel Krásenský,  
Ing. Čestmír Ondráček, Miroslav Radoň, Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.

Recenzenti příspěvků v tomto čísle / Reviewers of the contributions in the issue:

Stanislav Benedikt, Petr Bogusch, Jiří Janák, Jan Motejzík, Vlastimil Růžička, Kateřina Šumberová,  
Pavel Vonička, Martin Waldhauser, Pavel Zdvorač

## Pavouci (Araneae) údolí řeky Ohře v severozápadních Čechách

### Spiders (Araneae) of the Valley of the River Ohře in Northwestern Bohemia

Antonín Roušar

V Přírodě 4230, CZ-430 01 Chomutov, e-mail: arousar@volny.cz, GSM: +420 604120757

**Abstract:** This paper presents an evaluation of several years of spider collecting on the banks and riparian areas of the River Ohře in Northwestern Bohemia. A total of 10 localities were evaluated and 3942 spider specimens were collected. A total of 371 species were determined, which is 41 % of all spider species known in the Czech Republic, of which 123 species are included in some category (critically endangered, highly endangered, endangered or near threatened) on the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most significant species are *Baryphyma pratense*, *Drassyllus vinealis*, *Erigonoplus foveatus*, *Ipa terrenus*, *Prinerigone vagans* and *Phycosoma inornatum*, which are critically endangered and *Alopecosa schmidti*, *Altella biuncata*, *Brommella falcigera*, *Cetonana laticeps*, *Clubiona corticalis*, *Erigonoplus globipes*, *Ero tuberculata*, *Haplodrassus minor*, *Neon rayi*, *Panamomops inconspicuus*, *Styloctetor romanus*, *Syedra myrmicarum*, *Philodromus rufus* and *Staveleya pusilla*, which are classified as highly endangered.

**Keywords:** spiders, Araneae, faunistics, banks, riparian zone, xerothermic slopes, River Ohře, Northwestern Bohemia, Czech Republic

### Úvod

V této práci jsou prezentovány výsledky arachnologického průzkumu, který probíhal v letech 2003 až 2023 na březích řeky Ohře v úseku mezi Stráží nad Ohří (okres Karlovy Vary) a Stroupečí (část obce Žiželice, okres Louny). Celkem bylo nepravidelně navštěvováno deset lokalit (Obr. 1). Doposud se údaje o pavoucích žijících na březích Ohře objevily jen v několika odborných článcích (KRÁSENSKÝ et al. 2018, ROUŠAR 2015 a ŘEZÁČ 2009). Všechny tyto údaje jsou zařazeny do celkového seznamu druhů, včetně druhů *Iberina microphthalma*, *Micaria pulicaria*, *Styloctetor romanus* a *Syedra myrmicarum*, které byly odchyceny na lokalitě Stroupeč P. Krásenským.

### Zkoumané území

Sledované lokality se nacházejí ve dvou geologicky odlišných oblastech. První úsek se nalézá na styku Krušných a Doupovských hor, které odděluje průlomové údolím Ohře (lokality č. 1–4). Jedná se o úsek Ohře v celkové délce asi 20 km. Břehy s příbřežní zónou jsou lemovány především porosty olší, vrb a vlhkomilnými a mokřadními společenstvy bylin a keřů. Na jižně exponovaných xerothermních svazích se nacházejí kamenité stráně s acidofilními bučinami nebo doubravami, obnažené skály s porosty vřesu a borůvčí. Podle fytogeografického členění leží lokality v mezofytiku a ve dvou fytogeografických okresech – Krušnohorském podhůří a Doupovských vrších. Vegetační stupeň je submontánní (SKALICKÝ 1988). Podle klimaticko-geografického členění patří tento úsek do mírně teplé až chladné oblasti (QUITT 1971).

V druhém úseku řeka Ohře protéká podkrušnohorskými propadlinami, které patří do Mostecké pánve, konkrétně do podcelku Žatecké pánve (lokality 5–10). Jedná se o úsek v celkové délce asi

22 km. Na začátku tohoto úseku řeka protéká skalnatým meandrem kaňonovitého údolí řeky se smíšenými jasanovo-olšovými lužními lesy, opadavými křovinami, suchými doubravami, vřesovišti a trávniky na xerothermních stráních. V další části se nachází vegetace lesostepního charakteru, stepní trávniky, teplomilné doubravy, písčné pláže se štěrkem a kameny nebo sprašové stěny. Břehy a jejich okolí jsou porostlé vlhkomilnými dřevinami a bylinami. Podle fyto geografického členění leží lokality v termofytiku a spadají do fyto geografických okresů Doupovská pahorkatina a Střední Poohří. Vegetační stupeň je kolinní (SKALICKÝ 1988). Dle klimaticko-geografického členění patří tento úsek do teplé oblasti (QUITT 1971).

### Zkoumané lokality

U každé lokality je uvedeno číslo kvadrantu síťového mapování podle PRUNER & MÍKA (1996), včetně zeměpisných souřadnic (WGS84).

**1 – Stráž nad Ohří (5644)**, 50°19'54"N, 13°2'32"E, břehová a příbřežní vegetace, osluněné skály na levé straně Ohře (Obr. 2).

**2 – Boč (5644)**, 50°21'31"N, 13°5'36"E, břehová a příbřežní vegetace, xerothermní skalní svahy s acidofilní bučinou, balvanovou akumulací, porosty vřesu a borůvčí mezi skalami na levém břehu Ohře a vlhká louka na pravém břehu Ohře (Obr. 3).

**3 – Ohřecká louka (5644)**, 50°22'7"N, 13°9'40"E, břehová a příbřežní vegetace, xerothermní skalní svahy s acidofilní bučinou, nevelkými suťovými poli, porosty vřesu a borůvčí mezi skalami na pravém břehu Ohře. Příbřežní vegetace a zámecký park v Klášterci nad Ohří na levém břehu Ohře (Obr. 4).

**4 – Martiusovy skály (5645)**, 50°22'38"N, 13°14'7"E, břehová a příbřežní vegetace, xerothermní skalní svahy s doubravou na levém břehu Ohře a mokřad na pravém břehu Ohře (Obr. 5).

**5 – Želinský meandr (5645)**, 50°21'48"N, 13°17'41"E, břehová a příbřežní vegetace, xerothermní skalní svahy s doubravou, křovinami, vřesovišti, sutí na levém i pravém břehu Ohře (Obr. 6).

**6 – Běšický chochol (5646)**, 50°22'2"N, 13°21'19"E, teplomilná doubrava se suchými trávniky lesostepního charakteru na levém břehu Ohře (Obr. 7).

**7 – Čachovický vrch (5646)**, 50°22'5"N, 13°22'4"E, teplomilná doubrava se suchými trávniky lesostepního charakteru, čedičový vršek s drobnou sutí, na levém břehu Ohře (Obr. 8).

**8 – Nechranická přehrada (5646)**, 50°22'4"N, 13°22'41"E a 50°22'5"N, 13°25'32"E, břehové valy (navezené kameny), štěrkopískové náplavy, porosty keřů a stromů, svislé pískovcové stěny, xerothermní svahové lesíky, mokřady, vlhké louky, na levé i pravé straně přehrady. Příbřežní zóny jsou reziduálním územím, které oddělovalo údolí Ohře před zatopením od následující kulturní krajiny, pro břehy je význačné kolísání vodní plochy, kdy břeh ustupuje nebo postupuje (Obr. 9).

**9 – Stranná (5646)**, 50°22'1"N, 13°27'37"E, břehová a příbřežní vegetace, vlhká louka a travnaté svahy na levém břehu Ohře. Fragment lužního lesa, suchá louka s křovinami na pravém břehu Ohře (Obr. 10).

**10 – Stroupeč (5646, 5647)**, 50°21'34"N, 13°29'51"E, břehová a příbřežní vegetace, příkré svahy s křovinami, duby, náletovými listnáči, ovocnými stromy, teplomilnými trávniky na levém břehu Ohře (Obr. 11).

## Materiál a metodika

Pro sběr pavouků byly použity obvyklé metody sběru: smýkání, prosev, sklepávání, individuální sběr a zemní pasti se 4% roztokem formaldehydu. Materiál je konzervován v 70% denaturovaném etanolu a je uložen v autorově soukromé sbírce. Není-li uvedeno jinak, vše Antonín Roušar lgt., det. et coll.

Charakteristiky obývaných stanovišť pro jednotlivé druhy jsou převzaty z Katalogu pavouků České republiky (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002, ČAS 2024) a stupeň ohrožení podle ŘEZÁČE et al. (2015). Základní hodnoty jsou tištěny základním fontem, výrazně preferované hodnoty jsou tištěny tučně, některé okrajové, ale přesto nezanedbatelné hodnoty jsou uvedeny v závorce. Jako významné druhy sledovaných lokalit jsou vyhodnoceny ty, které preferují výhradně klimaxová stanoviště, dále všechny druhy vzácné a velmi vzácné, kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené i téměř ohrožené. Nomenklatura je přejata ze Světového katalogu pavouků (WSC 2024). V přehledu druhů jsou uvedeny všechny zjištěné druhy, včetně již publikovaných (KRÁSENSKÝ et al. 2018, ROUŠAR 2015 a ŘEZÁČ 2009) a náleží P. Krásenského.

### Použité zkratky:

FO	= fytogeografická oblast [phytogeographical area]
T	= termofytikum [the area of thermophilic flora and vegetation]
M	= mezofytikum [the area of mesophilic flora and vegetation]
O	= oreofytikum [the area of oreophilic flora and vegetation]
PS	= původnost stanovišť [origin of habitats]
c	= klimaxová stanoviště [climax habitats]
s-n	= polopřirozená stanoviště [semi-natural habitats]
a	= umělé stanoviště lidských sídel [artificial habitats of human settlements]
d	= pravidelně narušovaná stanoviště [regularly disturbed habitats]
HV	= hojnost výskytu [abundance]
VR	= velmi vzácný [very rare]
R	= vzácný [rare]
SO	= stupeň ohrožení [degree of endangerment]
KO	= kriticky ohrožený [critically endangered]
SO	= silně ohrožený [highly endangered]
O	= ohrožený [endangered]
TO	= téměř ohrožený [nearly endangered]
es	= materiál sebraný v rámci arachnologické exkurze na lokalitě Stroupeč (KRÁSENSKÝ 2018)

## Výsledky

Na deseti lokalitách ve vybraném úseku řeky Ohře bylo celkem odchyceno 3942 jedinců pavouků. Zjištěno bylo celkem 371 druhů náležejících do 31 čeledí, to představuje 41 % ze všech druhů pavouků známých z území České republiky. Nejpočetněji jsou zastoupeny čeledi Linyphiidae (116 druhů), Gnaphosidae (34 druhů), Theridiidae (32 druhů), Araneidae (27 druhů), Lycosidae (27 druhů), Salticidae (25 druhů) a Thomisidae (20 druhů).

Z celkového počtu zjištěných druhů je šest kriticky ohrožených, 14 silně ohrožených, 45 ohrožených a 58 téměř ohrožených. Podle hojnosti výskytu je 16 druhů velmi vzácných a 53 vzácných. Klimaxová stanoviště výhradně preferuje 64 druhů a 42 druhů je upřednostňuje. Celkem 38 druhů preferuje jenom fytogeografickou oblast termofytika a 28 druhů ji upřednostňuje. Jenom

mezofytikum preferuje 50 druhů a 126 druhů ho upřednostňuje. Z lokalit nacházejících se v oblasti mezofytika bylo nejvíce druhů zjištěno na lokalitě Boč (131). V oblasti termofytika se nejvíce druhů nacházelo v lokalitách Stroupeč (205), Stranná (156) a Želinský meandr (150).

### Přehled bioindikačně významných druhů

U každé lokality jsou také vypsány druhy vyskytující se pouze v dané lokalitě (jsou označeny hvězdičkou \*).

#### Mokřadní stanoviště

**Stráž nad Ohří:** *Clubiona corticalis*\*, *Baryphyma pratense*, *Helophora insignis*, *Walckenaeria unicornis*.

Poznámka: *Clubiona corticalis* je uváděn jako druh polovlhkých a vlhkých biotopů. V údolí Chomutovky v Krušných horách byl druh zjištěn na xerothermním svahu s teplomilnou doubravou, kde bylo odchyceno několik desítek jedinců pod kůrou borovic na xerothermním svahu s teplomilnou doubravou (ROUŠAR 2023).

**Boč:** *Walckenaeria unicornis*.

**Ohřecká louka:** *Baryphyma pratense*, *Dismodicus elevatus*\*, *Phycosoma inornatum*\*, *Prinerigone vagans*, *Rugathodes instabilis*\*, *Trochosa spinipalpis*\*, *Walckenaeria unicornis*.

Poznámka: Na této lokalitě byl jistěn druh *Araneus marmoreus* ve vzácné formě *pyramidatus*.

**Martiusovy skály:** *Walckenaeria unicornis*.

**Želinský meandr:** *Agyneta subtilis*, *Arctosa leopardus*, *Ceratinella major*, *Cyclosa oculata*, *Ero cambridgei*, *Porrhomma oblitum*, *Tapinocyba biscissa*, *Walckenaeria unicornis*.

**Nechranická přehrada:** *Agyneta subtilis*, *Arctosa leopardus*, *Clubiona diversa*, *Ero cambridgei*, *Haplodrassus minor*, *Porrhomma oblitum*, *Prinerigone vagans*, *Sintula corniger*\*, *Tapinocyba biscissa*, *Tibellus maritimus*\*, *Walckenaeria unicornis*.

**Stranná:** *Araneus alsine*\*, *Ceratinella major*, *Clubiona diversa*, *Dicymbium tibiale*\*, *Neon valentulus*\*, *Obscuriphantes obscurus*\*, *Silometopus reussi*, *Tapinocyba biscissa*, *Thanatus striatus*\*, *Walckenaeria unicornis*.

**Stroupeč:** *Silometopus reussi*, *Walckenaeria unicornis*.

Poznámka: Plachetnatka *Walckenaeria unicornis* je jediným druhem, který byl zaznamenán na všech mokřadních stanovištích.

#### Xerothermní stanoviště

**Boč:** *Acartauchenius scurrilis*, *Alopecosa inquilina*, *Atypus affinis*\*, *Altella biuncata*\*, *Callilepis schuszeri*, *Centromerus incilium*\*, *Centromerus serratus*\*, *Coriarachne depressa*\*, *Episinus truncatus*, *Ipa keyserlingi*, *Minicia marginella*, *Nusoncus nasutus*\*, *Panamomops affinis*\*, *Pelecopsis elongata*, *Porrhomma oblitum*, *Tapinocyboides pygmeus*, *Trichoncus affinis*, *Trichopterna cito*, *Typhochrestus digitatus*\*, *Walckenaeria simplex*\*.

**Ohřecká louka:** *Alopecosa inquilina*, *Callilepis schuszteri*, *Drassyllus villicus*, *Episinus truncatus*, *Ero aphana*, *Ero tuberculata*\*, *Heliophanus aeneus*\*, *Gibbaranea gibbosa*, *Ipa keyserlingi*, *Minicia marginella*, *Philodromus fuscomarginatus*\*, *Segestria bavarica*\*, *Tapinocyboides pygmeus*, *Textrix denticulata*, *Trichoncus affinis*.

**Martiusovy skály:** *Callilepis schuszteri*, *Ero aphana*, *Ipa keyserlingi*, *Trichopterna cito*.

**Želinský meandr:** *Acartauchenius scurrilis*, *Asianellus festivus*, *Brommella falcigera*\*, *Episinus truncatus*, *Eresus kollari*\*, *Erigone dentosa*\*, *Ero aphana*, *Evarcha laetabunda*, *Gnaphosa lucifuga*, *Haplodrassus kulczynskii*, *Heliophanus flavipes*, *Heterotheridion nigrovariegatum*, *Ipa keyserlingi*, *Micaria formicaria*, *Minicia marginella*, *Pellenes tripunctatus*, *Phrurolithus minimus*\*, *Spiracme striatipes*. *Textrix denticulata*, *Thanatus formicinus*, *Theonina cornix*, *Trichopterna cito*, *Xysticus acerbus*, *Zelotes aeneus*\*, *Zelotes erebeus*\*, *Zodarion rubidum*.

Poznámka: Význačný je nález pavučenky *Erigone dentosa* původem ze severní a střední Ameriky, která se objevila v Evropě teprve asi před deseti lety (KEKENBOSCH & BAERT 2013). Nachází se ve sklenících a jejich nejbližším okolí. Sporadicky se objevuje ve volné přírodě. Tento druh byl u nás nalezen dosud pouze jednou, a to v přírodní rezervaci Káraný (ČAS 2024).

**Běšický chochol:** *Agroeca cuprea*, *Alopecosa schmidtii*, *Callilepis schuszteri*, *Clubiona brevipes*, *Drassyllus villicus*, *Gibbaranea bituberculata*, *Gibbaranea gibbosa*, *Haplodrassus kulczynskii*, *Lathys humilis*, *Minicia marginella*, *Nematogmus sanguinolentus*, *Pseudicicus encarpatus*.

Poznámka: Po finální verzi článku objevil P. Krásenský druh *Atypus affinis*.

**Čachovický vrch:** *Agyneta cauta*\*, *Arctosa figurata*, *Asianellus festivus*, *Carrhotus xanthogramma*\*, *Episinus truncatus*, *Gibbaranea bituberculata*, *Gnaphosa opaca*, *Heliophanus flavipes*, *Ozyptila claveata*, *Pardosa bifasciata*, *Pellenes tripunctatus*, *Philodromus praedatus*, *Spiracme striatipes*, *Thanatus atratus*\*, *Thanatus formicinus*, *Xysticus acerbus*, *Zelotes longipes*, *Zodarion rubidum*.

**Nechranická přehrada:** *Agyneta subtilis*, *Brigittea latens*, *Gibbaranea bituberculata*, *Nematogmus sanguinolentus*, *Pelecopsis elongata*, *Xysticus luctator*, *Zelotes longipes*.

**Straná:** *Agalenatea redii*\*, *Agroeca cuprea*, *Agyneta mollis*\*, *Brigittea latens*, *Callilepis nocturna*, *Episinus truncatus*, *Ero aphana*, *Haplodrassus kulczynskii*, *Heliophanus flavipes*, *Heterotheridion nigrovariegatum*, *Cheiracanthium campestre*\*, *Micaria formicaria*, *Ozyptila claveata*, *Pardosa bifasciata*, *Philodromus praedatus*, *Pistius truncatus*, *Pseudicicus encarpatus*, *Simitidion simile*\*, *Synema globosum*, *Zelotes longipes*.

**Stroupeč:** *Agroeca cuprea*, *Alopecosa schmidtii*, *Arctosa figurata*, *Asianellus festivus*, *Brigittea latens*, *Callilepis nocturna*, *Cetonana laticeps*\*, *Civizelotes pygmeus*\*, *Clubiona brevipes*, *Cyclosa oculata*, *Drassyllus vinealis*\*, *Episinus truncatus*, *Erigonoplus foveatus*\*, *Erigonoplus globipes*\*, *Ero aphana*, *Evarcha laetabunda*, *Gibbaranea bituberculata*, *Gnaphosa lucifuga*, *Gnaphosa lugubris*\*, *Gnaphosa opaca*, *Haplodrassus kulczynskii*, *Haplodrassus minor*, *Heliophanus flavipes*, *Heterotheridion nigrovariegatum*, *Ipa terrenus*\*, *Lathys stigmatisata*\*, *Iberina microphthalma*\*, *Micaria formicaria*, *Micaria subopaca*\*, *Nematogmus sanguinolentus*, *Neon rayi*\*, *Ozyptila claveata*, *Panamomops inconspicuus*\*, *Pardosa bifasciata*, *Philodromus rufus*\*, *Pistius truncatus*, *Scotina palliardii*\*, *Spiracme striatipes*, *Staveleya pusilla*\*, *Steatoda triangulosa*\*, *Styloctetor romanus*\*, *Syedra myrmicarum*\*, *Synema globosum*, *Trochosa robusta*\*, *Xysticus acerbus*, *Xysticus lanio*\*, *Xysticus luctator*, *Zelotes longipes*, *Zodarion rubidum*.

Poznámka: Významný je nález vzácné přičnatky *Iberina microphthalma* odchycené do podzemní trubkové pasti. Za zmínku stojí nález synantropní snovačky *Steatoda triangulosa* pod kamenem na xerothermním svahu.

### Závěr

V letech 2003 až 2023 byl proveden výzkum pavouků na deseti lokalitách v údolí řeky Ohře. Čtyři lokality leží na území mezofytika, šest na území termofytika. Pavouci byli sbíráni na typických biotopech říčního údolí – jak v údolních mokřadech, tak na xerothermních svazích. Celkem bylo sebráno 3962 exemplářů příslušejících 371 druhům.


K nejvýznamnějším patří nálezy druhů *Baryphyma pratense*, *Drassyllus vinealis*, *Erigonoplus foveatus*, *Ipa terrenus*, *Phycosoma inornatum* a *Prinerigone vagans*, které jsou kriticky ohrožené, a druhů *Alopecosa schmidtii*, *Altella biuncata*, *Brommella falcigera*, *Cetonana laticeps*, *Clubiona corticalis*, *Erigonoplus globipes*, *Ero tuberculata*, *Haplodrassus minor*, *Neon rayi*, *Panamomops inconspicuus*, *Philodromus rufus*, *Staveleya pusilla*, *Styloctetor romanus*, *Syedra myrmicarum*, které jsou zařazeny v kategorii silně ohrožených druhů. Významný je také nález skrytě žijící přičnatky *Iberina microphthalma*. Pozoruhodný je i nález pavučenky *Erigone dentosa*. V České republice byl tento druh zjištěn dosud pouze jednou, a to v přírodní rezervaci Káraný u Čelákovice (ČAS 2024).

### Poděkování

Děkuji P. Krásenskému za spolupráci při výměně informací a také za pomoc s konečnou úpravou článku.

### Literatura

- BUCHAR J. & RŮŽIČKA V. (2002): *Catalogue of spiders of the Czech Republic*. – Peres, Praha. 351 pp.
- ČAS [Česká arachnologická společnost] (2024): [Online atlas:] *Řád Araneae*. [Online: <https://arachnology.cz/rad/araneae-1.html>. Použito 23. 7. 2024.]
- KEKENBOSCH R. & BAERT L. (2013): Découverte d'*Erigone dentosa* (O.P.-Cambridge, 1894) (Araneae: Linyphiidae, Erigoninae) en Belgique. – *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, Gent, 28 (1–2): 32–34.
- KRÁSENSKÝ P., BRYJA V., DOLANSKÝ J., DOLEJŠ P., HAMŘÍK T., JELÍNEK A., KREJČÍ T., MACHAČ O., ROUŠAR A., ŘEZÁČ M. & ŠICH R. (2018): Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy) [Spiders of selected localities of Most, Chomutov and Žatec regions (Northwestern Bohemia)]. – *Sborník Oblastního muzea v Mostě, Most, řada přírodovědná*, 39 (2017): 110–129.
- PRUNER L. & MÍKA P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. – *Klapalekiana*, Praha, 32 (Suppl.): 1–175.
- ROUŠAR A. (2015): Pavouci a sekáči přibřežní zóny Nechranické přehrady. – *Památky, příroda, život*, Chomutov, 47 (1): 23–32.
- ROUŠAR A. (2023): Pavouci (Araneae) horského údolí říčky Chomutovky v Krušných horách (severozápadní Čechy). – *Sborník Oblastního muzea v Mostě, Most, řada přírodovědná*, 41: 133–152.
- ŘEZÁČ M. (2009): Rozšíření a ochrana pavouků sklípkánek (Araneae: Atypus spp.) v České republice [Distribution and conservation of the purse-web spiders (Araneae: Atypus spp.) in the Czech Republic]. – *Příroda*, Praha 28: 3–43.
- ŘEZÁČ M., KŮRKA A., RŮŽIČKA V. & HENEBERG P. (2015): Red List of Czech spiders: 3rd edition, adjusted according to evidence-based national conservation priorities. – *Biologia*, 70: 645–666.
- QUITT E. (1971). Klimatické oblasti Československa. – *Studia geographica*, Brno, 16: 1–73 + 1 mapa.
- SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. – In: Hejný S., Slavík, B. Chrtek J. [sen.], Tomšovic P. & Kovanda M. [eds.], *Květina České socialistické republiky*, Academia, Praha, Vol. 1: 103–121.
- WSC (2024): *World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, version 21.5*. – [Online: <http://www.wsc.nmbe.ch/>. Použito 23. 7. 2024.]



Obr. 1. / Fig. 1. Mapa s lokalitami / Map with localities: 1 – Stráž nad Ohří, 2 – Boč, 3 – Ohřecká louka, 4 – Martiusovy skály, 5 – Želinský meandr, 6 – Běšický chochol, 7 – Čachovický vrch, 8 – Nechanická přehrada, 9 – Stranná, 10 – Stroupeč.



Obr. 2. / Fig. 2. Stráž nad Ohří. Foto / Photo by A. Roušar.



Obr. 3. / Fig. 3. Boč. Foto / Photo by A. Roušar.



**Obr. 4. / Fig. 4.** Ohřecká louka. Foto / Photo by A. Roušar.



**Obr. 5. / Fig. 5.** Martiusovy skály. Foto / Photo by A. Roušar.



**Obr. 6. / Fig. 6.** Želinský meandr. Foto / Photo by A. Roušar.



**Obr. 7. / Fig. 7.** Běšický chochol. Foto / Photo by A. Roušar.



**Obr. 8. / Fig. 8.** Čachovický vrch. Foto / Photo by A. Roušar.



**Obr. 9. / Fig. 9.** Nechranická přehrada po částečném vypuštění. Foto A. Roušar.  
**Fig. 9.** Reservoir Nechranice after partial water discharge. Photo by A. Roušar.



Obr. 10. / Fig. 10. Stranná. Foto / Photo by A. Roušar.



Obr. 11. / Fig. 11. Stroupeč. Foto / Photo by A. Roušar.



Čeľad' (Family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokality číslo												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<i>Araneus sturmi</i> (Hahn, 1831)	T M			TO	1	1													
<i>Araneus triguttatus</i> (Fabricius, 1775)	M			TO	1	1													1/1
<i>Aranella cucurbitina</i> (Clerck, 1757)	(T) M				17	9				2/1	1/1	3/0	1/1		1/1	0/1	1/2	8/2	
<i>Aranella opishographa</i> (Kulezyski, 1905)	T M				5	2				1/0			1/0	0/1			1/0	2/1	
<i>Argope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	T M				7	6								1/3	1/0		0/1	5/2	
<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)	(T) M					4							0/1		0/1			0/2	
<i>Cyclosa oculata</i> (Walckenaer, 1802)	M	c	R	O	2	2							0/1					0/1	
<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)	T (M)	c		TO	14	4								5/0	3/1	4/0	1/0	1/3	
<i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802)	T M			O	3	3				2/0				1/0					
<i>Hypsosinga albovitata</i> (Westring, 1851)	T M	e s-n		TO	8	3									1/0			6/3	
<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C.L.Koch, 1844)	(T) M				4	6							0/1					4/5	
<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1757)	M	e s-n			1	2										1/1	0/1		
<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1757)	M			TO	11	9					1/0	0/2	0/3			1/1	8/2	1/1	
<i>Larinioides sciopetarius</i> (Clerck, 1757)	M				2	5				0/1			2/3				0/1		
<i>Larinioides suspicax</i> (O. Pickard-Cambridge, 1876)	T M	e s-n			2	2										0/1	0/1		
<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	T M				18	17				2/1			0/1	1/0	1/0	1/0	5/5	9/10	
<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1757)	(T) M					11				0/2	0/1			0/2	0/2			0/4	
<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1757)	T M				5	1										5/0	0/1		
<i>Singa nitidula</i> C.L.Koch, 1844	T M			TO	6	5										1/2	2/3	2/1	1/0
<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)	M			TO	4	9				1/3	0/1	1/1			0/1		0/1	0/1	2/1
<b>Atypidae</b>																			
<i>Atypus affinis</i> Eichwald, 1830	(T) M	c		TO	1	1				0/1									
<b>Cheiracanthiidae</b>																			



Čeleď (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokalita číslo																		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)	T	c	R	O	1	2				0/2															
<i>Lathys stigmatisata</i> (Menge, 1869)	T	c	R	O	2	2														2/2					
<i>Nigma flavescens</i> (Walckenaer, 1830)	TM				13	5	1/0													2/0	10/5				
<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)	TM				3	1	2/0														1/1				
<b>Dysderidae</b>																									
<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer, 1802)	T (M)	c (a)			8	6	1/0				0/2	1/1	1/0							1/2	4/1				
<i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)	TM				4	3	1/0	1/3		2/0															
<i>Harpactea lepida</i> (C.L.Koch, 1838)	M (O)				1		0/1																		
<i>Harpactea rubicunda</i> (C.L.Koch, 1838)	TM				9	12	1/0				1/2	2/1	1/0	1/3	1/0						2/6				
<b>Eresidae</b>																									
<i>Eresus kollari</i> Rossi, 1846	T	c	R	O	2						2/0														
<b>Gnaphosidae</b>																									
<i>Callilepis nocturna</i> (Linnaeus, 1758)	TM				5	5															0/1	5/4			
<i>Callilepis schuszeri</i> (Herman, 1879)	T	c	R	O	2	6	2/1	0/2	0/1		0/2														
<i>Chivzelotes pygmaeus</i> (Miller, 1943)	T	c	R	O	7	6																7/6			
<i>Drassodes cupreus</i> (Blackwall, 1834)	M	c s-n		TO	2									0/2											
<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	TM				11	11	6/4				1/1			2/3								2/3			
<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)	TM				5	2					0/1											1/0	4/1		
<i>Drassyllus luteitarsis</i> (L.Koch, 1866)	(T) M				4	3																1/2	0/1	3/0	
<i>Drassyllus praeficus</i> (L.Koch, 1866)	TM	c s-n			7	4						0/1											3/2	4/1	
<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L.Koch, 1833)	TM				6	3						1/0											0/1	2/1	3/1
<i>Drassyllus villicus</i> (Thorell, 1875)	T	c	R	O	1	3						0/2													



Čeďed' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokalita číslo										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Zelotes subterraneus</i> (C.L.Koch, 1833)	(T) M (O)				6	8	5/3				0/1		1/2		0/1	0/1	
<b>Halnidae</b>																	
<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	(T) M				3						1/0				2/0		
<i>Hahnia heveola</i> Simon, 1875	M			TO	1					1/0							
<i>Hahnia nova</i> (Blackwall, 1841)	T M	e s-n			1								1/0				
<i>Hahnia pusilla</i> C.L.Koch, 1841	M				3	6	1/6				1/0					1/0	
<i>Iberina microphthalmala</i> (Snazell & Duffey, 1980)	M	s-n	VR	TO		2										0/2	
<b>Linyphiidae</b>																	
<i>Abacoproces saluum</i> (L.Koch, 1872)	M	e s-n			17	17	9/9	0/1			1/5	1/0	2/0	2/1	2/1	2/1	
<i>Acartauchenius scurrilis</i> (O.Pickard-Cambridge, 1873)	T M		R	O	1	5	0/1				0/2					1/2	
<i>Agyreta affinis</i> (Kulczynski, 1898)	(T) M O	e s-n			2	2		1/0					0/2			1/0	
<i>Agyreta cauta</i> (O.Pickard-Cambridge, 1903)	M O	e s-n		TO	1	1							0/1				
<i>Agyreta conigera</i> (O.Pickard-Cambridge, 1863)	(M) O				1	0/1											
<i>Agyreta mollis</i> (O.Pickard-Cambridge, 1871)	T M O	e s-n		TO	1	1									0/1		
<i>Agyreta rurestris</i> (C.L.Koch, 1836)	T M O				21	17					1/3		2/0	10/7	8/7		
<i>Agyreta saxatilis</i> (Blackwall, 1844)	M					2	0/1	0/1									
<i>Agyreta subtilis</i> (O.Pickard-Cambridge, 1863)	M	e s-n		O	2						1/0			1/0			
<i>Allomengea scopigera</i> (Grube, 1859)	M O				1	1/0											
<i>Araeoncus humilis</i> (Blackwall, 1841)	(T) M					1									0/1		
<i>Baryphyma pratense</i> (Blackwall, 1861)	(T) M	s-n	VR	KO	1	3	1/2	0/1									
<i>Bathyphanes approximatus</i> (O.Pickard-Cambridge, 1871)	(T) M	e s-n			1	4	1/2							0/1	0/1	0/1	
<i>Bathyphanes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	T M (O)				2	5		0/1			1/0			0/3	1/1	1/1	
<i>Bathyphanes nigrinus</i> (Westring, 1851)	T M (O)				34	15	8/4	4/3			3/4			18/3	1/1	1/1	

Čeľad' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokalita číslo										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Bathypantes parvulus</i> (Westring, 1851)	(T) M				3	1										2/1	1/0
<i>Centromerus arcanus</i> (O.Pickard-Cambridge, 1873)	M O	e s-n			5	5					5/5						
<i>Centromerus inclinum</i> (L. Koch, 1881)	(T) M	e s-n		O	5	7				5/7							
<i>Centromerus serratus</i> (O.Pickard-Cambridge, 1875)	T M	c	R	TO		4			0/4								
<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)	T M O				17	15			0/1	2/1		5/5			4/3	6/5	
<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)	M (O)				37	16			1/4	1/1		0/1				35/10	
<i>Ceratinella major</i> Kulezynski, 1894	(T) M	c	R	TO	1	2					1/1					0/1	
<i>Ceratinella scabrosa</i> (O.Pickard-Cambridge, 1871)	M				2				1/0								
<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)	M (O)					2						0/1				0/1	
<i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)	(T) M (O)				3	2				1/0					0/1	1/0	1/1
<i>Dicymbium tibiale</i> (Blackwall, 1836)	M O	c		TO		1										0/1	
<i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)	M (O)					2			0/1	0/1							
<i>Diplocephalus latifrons</i> (O.Pickard-Cambridge, 1863)	M O	e s-n			2	4										2/3	0/1
<i>Diplocephalus pictus</i> (Blackwall, 1841)	(T) M (O)				13	13			2/3	2/4	3/2		1/3		4/1	1/0	
<i>Diplosyla concolor</i> (Wider, 1834)	T M O				13	18			5/6	0/1	0/3		0/1		0/1	8/5	0/1
<i>Dismodicus bifrons</i> (Blackwall, 1841)	M (O)				2	11			2/5	0/2		0/1				0/2	0/1
<i>Dismodicus elevatus</i> (C.L.Koch, 1838)	M (O)		R	TO	2						1/0				1/0		
<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)	M				10	13			1/1	0/2	0/1	6/3		1/1	1/2	1/1	0/2
<i>Entelecara congenera</i> (O.Pickard-Cambridge, 1879)	M				1	2			1/0	0/2							
<i>Entelecara erythropus</i> (Westring, 1851)	M					4			0/1						0/3		
<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	T M O				8	17			4/3	0/1	2/2				2/9	0/2	
<i>Erigone dentosa</i> O.Pickard-Cambridge, 1894	?	?	?	?	1							1/0					
<i>Erigone denitpalpis</i> (Wider, 1834)	T M O				10	16			2/1	0/1		1/0			6/11		1/3

Čeľad' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokalita číslo											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<i>Erigonella hiemalis</i> (Blackwall, 1841)	M (O)				2	3						0/1				0/1	2/1	
<i>Erigonopus foveatus</i> (Dahl, 1912)	T	c	VR	KO	2	6												2/6
<i>Erigonopus globipes</i> (L.Koch, 1872)	T M	c	R	SO	6	1												6/1
<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)	M				3	4	1/2										2/2	
<i>Gnathonarum dentatum</i> (Wider, 1834)	(T) M				1											1/0		
<i>Gongylideltum latebricola</i> (O.Pickard-Cambridge, 1871)	M (O)				1											0/1		
<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	(T) M				42	38	10/10	4/3	5/7	1/0						5/5	10/10	7/3
<i>Helophora insignis</i> (Blackwall, 1841)	M	c			1	0/1												
<i>Hyllyphantes graminicola</i> (Sundevall, 1830)	M			TO	2											1/0	1/0	
<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)	(T) M				6	8			0/1							0/1	1/2	5/4
<i>Ipa keyserlingi</i> (Ausserer, 1867)	T (M)	c		O	7	15	0/2	1/0	5/13									
<i>Ipa terrenus</i> (L.Koch, 1879)	T M	c	VR	KO	1	1												1/1
<i>Kaestneria dorsalis</i> (Wider, 1834)	M			TO	1	2				1/1						0/1		
<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)	M O	e s-n			1			0/1										
<i>Lephyphantes leprosus</i> (Ohlert, 1865)	(T) M				4	7		1/5		3/2								
<i>Lephyphantes minutus</i> (Blackwall, 1833)	T M				2											0/1	0/1	
<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1830	(T) M				4	9		4/2		0/2						0/2	0/2	0/1
<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	T M				14	18	2/0			2/1					0/1	10/14	0/2	
<i>Mansuphantes mansuetus</i> (Thorell, 1875)	M				1	2				1/2								
<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)	T M (O)				3	4	0/1			1/1						1/2	1/0	
<i>Mermessus trilobatus</i> (Emerton, 1882)	T M				11	6		1/2	8/2	0/1						1/1	1/0	1/0
<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)	(T) M O				2	1	1/0			0/1							1/0	
<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)	T M				2	5		0/1				1/1				0/1	0/1	1/2



Čeľad' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokalita číslo											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953	(T) M				7	2	1/0	1/2									5/0	
<i>Porhomma microphthalmum</i> (O.Pickard-Cambridge, 1871)	TM				1	7			0/1							1/5		0/1
<i>Porhomma oblitum</i> (O.Pickard-Cambridge, 1871)	TM	c	R		4	2	1/2		1/0						2/0			
<i>Porhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)	TM	e s-n			6	4	0/1								6/3			
<i>Primerigone vagans</i> (Audouin, 1826)	T	(c)	VR	KO	5	6	1/0								4/6			
<i>Silometopus reussi</i> (Thorell, 1871)	M	c d			2	2										0/1		0/1
<i>Sintula corniger</i> (Blackwall, 1856)	(M) O	c		TO	1	1									0/1			
<i>Staveleya pusilla</i> (Menge, 1869)	T	c	VR	SO	11	3												11/3
<i>Stenomorphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	(T) M				2	1			2/1									
<i>Sylocetor romanus</i> (O.Pickard-Cambridge, 1873)	TM	c	VR	SO	2	2												0/2
<i>Sydrta myrmicarum</i> (Kulezyski, 1882)	M	c	VR	SO	2	2												0/2
<i>Tapinocyba biscaissa</i> (O.Pickard-Cambridge, 1873)	M	e s-n	R	TO	7	14	1/1		2/1						3/12	1/0		
<i>Tapinocyboides pygmaeus</i> (Menge, 1869)	TM	e s-n		O	4	4	0/3	0/1										
<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)	TM				12	15	0/1	2/3	1/2					1/1	1/0	4/1	1/6	
<i>Tenuiphantes mengeti</i> (Kulezyski, 1887)	T M O				2	9	2/2	0/1							0/3	0/1	0/2	
<i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider, 1834)	M O				1	1			0/1					1/0				
<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)	TM				6	16		1/2						0/3		2/5		4/6
<i>Theonina cornix</i> (Simon, 1881)	T	c	R	O	2	2			2/0									
<i>Thyreosthenius parasiticus</i> (Westring, 1851)	M O				1	2			0/1	0/1					1/0			
<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)	M (O)				4	4	0/2		0/1							0/1		
<i>Trematocephalus cristatus</i> (Wider, 1834)	(T) M				7	8	0/1	1/0		0/1					1/0	0/1	5/5	
<i>Trichoncus affinis</i> Kulezyski, 1894	TM	c		O	2	2	1/2	1/0										
<i>Trichopterna cito</i> (O.Pickard-Cambridge, 1873)	M	c	R	O	3	7			0/1	1/3								2/3

Čeľad' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokality číslo																
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
<i>Troxochrus scabriculatus</i> (Westring, 1851)	M					1					0/1												
<i>Typhochrestus digitatus</i> (O.Pickard-Cambridge, 1873)	TM	c		TO	1	2					0/1			1/1									
<i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)	(T) M (O)					1					0/1												
<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O.Pickard-Cambridge, 1878)	TMO				14															14/0			
<i>Walckenaeria corniculans</i> (O.Pickard-Cambridge, 1875)	M				1	1					1/0			0/1									
<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L.Koch, 1836)	M (O)				2						0/1			0/1									
<i>Walckenaeria cuspidata</i> Blackwall, 1833	M (O)				1						1/0												
<i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge, 1869)	TM				1	3					1/3												
<i>Walckenaeria simplex</i> Chyzer, 1894	T	e s-n	R	O	1						1/0												
<i>Walckenaeria unicornis</i> O.Pickard-Cambridge, 1861	(T) M		R	TO	24	20					3/2	0/1	1/1	0/1	0/1				6/1	12/11	2/2		
<b>Liocranidae</b>																							
<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	TM				3																3/0		
<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873	TM	c		TO	11	5								2/0	1/0						5/2	3/3	
<i>Apostenus fuscus</i> Westring, 1851	TM				11	8					4/4			7/4									
<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)	?	c a				3					0/2			0/1									
<i>Scotina palliardii</i> (L.Koch, 1881)	TM	c	R	O	1																	1/0	
<b>Lycosidae</b>																							
<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)	TM (O)				38	11								3/1		24/8						4/1	7/1
<i>Alopecosa farinosa</i> (Herman, 1879)	TM	e s-n			13	4										11/2							2/2
<i>Alopecosa inquitina</i> (Clerck, 1757)	M			TO	3	5					1/3	2/2											
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	TM (O)				14	8															1/0	13/6	0/2
<i>Alopecosa schmidti</i> (Hahn, 1835)	T	c	R	SO	1	2									1/0								0/2
<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757)	TM				6																		6/0

Čeľad' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokality číslo												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<i>Arcosa figurata</i> (Simon, 1876)	T (M)	c	R	O	5	1									2/0				3/1
<i>Arcosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)	(T) M	c s-n		O	4	3						0/1				4/2			
<i>Antonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	T M				7	3							0/2						7/1
<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)	T M				5											5/0			
<i>Pardosa alacris</i> (C.L.Koch, 1833)	T (M)				15	19				5/0		3/0			5/0	1/0			3/2
<i>Pardosa ameniata</i> (Clerck, 1757)	T M O				15	19	4/4	2/2	1/4							5/5			3/4
<i>Pardosa bifasciata</i> (C.L.Koch, 1834)	T	c		O	15	8						0/2			0/2			3/2	12/2
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	T M O				18	26		3/4	0/1			1/2				4/5	5/9	5/5	
<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	T M O				1	1	0/1									1/0			
<i>Pardosa prativaga</i> (L.Koch, 1870)	T M				4	7	0/1		0/1							1/2	2/3	1/0	
<i>Pardosa riparia</i> (C.L.Koch, 1833)	T M O				2	2		0/2											
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	T M O				1	4		0/1	0/2	0/1								1/0	
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	T M O				1	4			1/3							0/1			
<i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872)	T M O				2	5	1/0	1/0								0/2	0/3		
<i>Pirantula latitans</i> (Blackwall, 1841)	T M				1	1										0/1			
<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)	T M	c s-n		TO	3	3													0/3
<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)	T M				7	5	3/2		0/1							3/1	0/1	1/0	
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O.Pickard+Cambridge, 1895)	(T) M O			TO	1	1			1/0										
<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	T M (O)				40	9	5/0	0/1				5/1				1/5	27/2	2/0	
<i>Xerohycosa miniata</i> (C.L.Koch, 1834)	T M				5	5	0/1									0/1			0/3
<i>Xerohycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)	T M O				8	1			0/1	1/0						1/0	3/0	3/0	
<b>Mimetidae</b>																			
<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	T	c	R	TO	6	11			1/2	1/0	0/2								4/6

Čeled' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokality číslo												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<i>Ero cambridgei</i> Kulezýnski, 1911	(T) M					2							0/1						
<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)	TM				1						1/0								
<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)	T	e s-n	R	SO		2					0/1								
<b>Miturgidae</b>																			
<i>Zora nemoralis</i> (Blackwall, 1861)	(T) M				1	1				1/1									
<i>Zora sivestris</i> Kulezýnski, 1897	M				4	3							0/1				0/1		4/1
<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	T M (O)				11	7				1/0			0/2			3/2		5/3	2/0
<b>Nesticidae</b>																			
<i>Nesticus cellulamus</i> (Clerck, 1757)	M				3	1				2/1	1/0								
<b>Philodromidae</b>																			
<i>Philodromus albidus</i> Kulezýnski, 1911	T M				20	13				2/0	1/1			1/1	2/1	2/1		4/1	8/8
<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1757)	T M				5	3				4/1			0/1	1/0				0/1	
<i>Philodromus cespitum</i> (Walekenaer, 1802)	T M				15	13				0/1	0/1		0/1	0/1		3/0	1/1	4/5	7/4
<i>Philodromus collinus</i> C.L.Koeh, 1835	(T) M (O)				1	1					1/1								
<i>Philodromus dispar</i> Walekenaer, 1826	T M				1	3				1/0			0/1		0/2				
<i>Philodromus fuscomarginatus</i> (De Geer, 1778)	M			O		1					0/1								
<i>Philodromus praedatus</i> O.Pickard-Cambridge, 1871	T M	e s-n	R	TO	5	4										1/2		3/1	1/1
<i>Philodromus rufus</i> Walekenaer, 1826	T		VR	SO	1														1/0
<i>Thanatus atratus</i> Simon, 1875	T (M)	e	R	O	1	1										1/1			
<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757)	T M	e s-n		TO	2	4								1/2		1/2			
<i>Thanatus striatus</i> C.L.Koeh, 1845	(T) M			TO		1													0/1
<i>Tibellus maritimus</i> (Menge, 1875)	M		R	O	1													1/0	
<i>Tibellus oblongus</i> (Walekenaer, 1802)	T M				13	8									1/1	2/1	1/2	2/1	7/3

Čeďed' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokality číslo																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
<b>Pholcidae</b>																								
<i>Pholcus optilonoides</i> (Schrank, 1781)	?				6	8							0/2				1/0			5/5				
<b>Phrurolithidae</b>																								
<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L.Koch, 1835)	TM				36	34							10/10	10/10			3/2			7/6				
<i>Phrurolithus minimus</i> C.L.Koch, 1839	TM	e s-n	R	O	1	3							1/3											
<b>Pisauridae</b>																								
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)	TM				28	26							2/2		4/2					10/10	11/11			
<b>Salticidae</b>																								
<i>Aeturrillus v-insignitus</i> (Clerck, 1757)	TM				5	2							2/2								1/0			
<i>Astaneilus festivus</i> (C.L.Koch, 1834)	TM	c	R	TO	6	10							1/2				2/3				3/5			
<i>Ballus chadybeitus</i> (Walcenaer, 1802)	TM				16	14							4/2				2/0	0/1	3/3		2/2	5/6		
<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)	T	c	R	O	1																			
<i>Dendryphanes rufus</i> (Sundevall, 1833)	M				1	2																1/2		
<i>Euophrys frontalis</i> (Walcenaer, 1802)	TM				11	10							2/1				0/3					2/2	4/4	
<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)	TM				18	11							1/0	1/1			2/2	3/2	2/0	1/1		4/3	4/2	
<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1757)	(T) M				3	2							1/1										1/0	
<i>Evarcha laetabunda</i> (C.L.Koch, 1846)	T (M)	c		O	5	1											2/0						3/1	
<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1832)	(T) M	c		TO	1									1/0										
<i>Heliophanus auratus</i> C.L.Koch, 1835	TM			TO	4	5												0/1				3/2	0/2	1/0
<i>Heliophanus cupreus</i> (Walcenaer, 1802)	TM				25	11							5/0	2/0	2/2	5/5	2/0						1/1	6/3
<i>Heliophanus dubius</i> C.L.Koch, 1835	M					1							0/1											
<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)	(T) M	c			33	20											5/1					4/4	1/0	23/15
<i>Neon rayi</i> (Simon, 1875)	T	c	R	SO		2																		0/2



Čeďed' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokalita číslo											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L.Koch, 1837	M				5	2				1/0						2/0	1/0	1/2
<i>Tetragnatha pinicola</i> L.Koch, 1870	T M				4	6	1/1									0/1		3/4
<b>Theridiidae</b>																		
<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L.Koch, 1836)	T M				6	9	0/2	0/1		0/1							1/0	5/5
<i>Crustulha guttata</i> (Wider, 1834)	M				2	7	2/7											
<i>Cryptachaea riparia</i> (Blackwall, 1834)	(T) M				2			1/0										1/0
<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L.Koch, 1837)	T	e s-n			4	16	0/2	0/1	0/1	1/3	1/2	0/2					1/2	1/3
<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982	T M				1	7				0/2						0/1		1/4
<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	T M				5	8	1/1	0/1	3/1	0/1						0/1	1/1	0/2
<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)	T M				9	10	2/3	1/0				2/0	0/1	1/0	3/6			
<i>Episimus truncatus</i> Latreille, 1809	T	e s-n		TO	11	14	1/0	2/0		1/3					1/3		6/7	
<i>Euryopsis flavomaculata</i> (C.L.Koch, 1836)	T M				13	14	1/0	0/1							0/1	10/10	2/2	
<i>Heteroheridion nigrovirgatatum</i> (Simon, 1873)	T	e s-n	R	O	16	10				0/2							0/1	16/7
<i>Lasaeola tristis</i> (Hahn, 1833)	M			TO	2	5												2/5
<i>Neottitura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	T M				24	23	0/5	1/2		2/1	0/2				1/1	1/1	19/11	
<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)	M				13	15		0/1			1/3				1/1	1/0	10/10	
<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1757)	(T) M				2	4	1/2				1/1						0/1	
<i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell, 1875)	(T) M					2	0/1										0/1	
<i>Parasteatoda tepidarium</i> (C.L.Koch, 1841)	?	a			1	1		0/1		1/0								
<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)	M	e s-n			4	5	4/5											
<i>Phycosoma inornatum</i> (O.Pickard-Cambridge, 1861)	M	c	VR	KO	1	1		1/1										
<i>Phylloneta impressa</i> (L.Koch, 1881)	T M (O)				12	14						2/5					10/9	
<i>Phylloneta sisyphta</i> (Clerck, 1757)	M (O)				1												1/0	

Čeľad' (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokality číslo									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Platnickina tineta</i> (Walckenaer, 1802)	TM				8	13		0/3	2/1	1/2		1/1	1/0		1/0	2/6
<i>Robertus arundineti</i> (O.Pickard-Cambridge, 1871)	(TM)				4	4								4/1	0/1	0/2
<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)	TMO					1		1/0					0/1			
<i>Rugathodes bellicosus</i> (Simon, 1873)	MO	e (s-n)				1										0/1
<i>Rugathodes instabilis</i> (O.Pickard-Cambridge, 1871)	TM	e s-n	R	O	3	3			0/3							
<i>Simitidion simile</i> (C.L.Koch, 1836)	TM		R	O	1	1									0/1	
<i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	?				2	6	0/1	2/4	0/1							
<i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer, 1802)	?	a	VR			1										0/1
<i>Theridion hemerobium</i> Simon, 1914	TM	e s-n			1	1			0/1							
<i>Theridion mystaceum</i> L.Koch, 1870	M				2	8		1/2	1/2	0/2	0/1					0/1
<i>Theridion pinastri</i> L.Koch, 1872	TM				2	9		0/1	0/1		0/3				0/1	2/3
<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833	TM				17	17	0/1	1/1	1/1		1/0	3/2		0/1	5/5	6/6
<b>Thomisidae</b>																
<i>Coriarachne depressa</i> (C.L.Koch, 1837)	TM			TO	1			1/0								
<i>Ebrechtella tricuspidata</i> (Fabricius, 1775)	T(M)				8	3			2/1		1/0			0/1	3/1	2/0
<i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)	TM				2	1		0/1	2/0							
<i>Misumena vatia</i> (Clereh, 1757)	TM				2											2/0
<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)	TM				4	5					1/0		2/3		0/2	1/0
<i>Ozyptila clavata</i> (Walckenaer, 1837)	TM	c		TO	15	9								3/0	0/1	9/2
<i>Ozyptila praticola</i> (C.L.Koch, 1837)	TM				19	11		1/0	1/2		1/2			1/1	15/6	
<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	M(O)				4	1	3/0		1/1							
<i>Pisius truncatus</i> (Pallas, 1772)	TM		R	TO	2	4					0/1					1/1

Čeleď (family) / druh (species)	FO	PS	HV	SO	♂	♀	lokality číslo									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Spiracme striatipes</i> (L.Koch, 1870)	TM	c	R	O	12	3				2/0		0/1		4/0	6/2	
<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)	TM		R	TO	8	3								5/3	0/3	
<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872	T (M)	c	R		2	2				1/1		1/0			0/1	
<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)	(T) M (O)				7							1/0		2/0	1/0	
<i>Xysticus bifasciatus</i> C.L.Koch, 1837	(T) M (O)				2	1						1/0			0/1	
<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	TM (O)				6	11	1/0	1/3		0/1	1/0		0/1	2/2	1/4	
<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)	(T) M				6	2	1/0			1/0		1/0		1/0	2/2	
<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872	TM				5	10				1/1			0/1		4/8	
<i>Xysticus lanio</i> C.L.Koch, 1835	TM			TO	2	2	1/0								1/2	
<i>Xysticus luctator</i> L.Koch, 1870	TM			O	3								2/0		1/0	
<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)	(T) M				4	2		2/2		1/0				1/0		
<b>Titanoecidae</b>																
<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn, 1833)	TM	e s-n			23	23	10/10	0/2	5/4						8/7	
<b>Trachelidae</b>																
<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)	T	c	VR	SO		2									0/2	
<b>Zodariidae</b>																
<i>Zodarion germanicum</i> (C.L.Koch, 1837)	TM	e s-n			11	4	1/0		5/4	5/0						
<i>Zodarion rubidum</i> Simon, 1914	T	c s	R		6	2			2/2	1/0					3/0	

# Contents / Inhalt

## Botany / Botanik

JOZA V. & ZDVOŘÁK P.: Naturalization of Foxglove Tree ( <i>Paulownia tomentosa</i> /Thunb./ Steud.) in Northwestern Bohemia .....	1
JOZA V.: Escaping of Common Milkweed ( <i>Apocynaceae: Asclepias syriaca</i> ) in Northwestern Bohemia .....	10
JOZA V.: Contribution to the flora of the Most a Litvínov regions (Northwestern Bohemia) V .....	15
JOZA V. [red.]: The pretty rare woody plants planted in Northwestern Bohemia (2) .....	31
JOZA V.: Vegetation of exposed bottoms of standing and running waters in Northwestern Bohemia I. Fishpond Dobroměřický (Dobroměřice village, Louny county) .....	63

## Zoology / Zoologie

KRÁSENSKÝ P.: Ground beetles and rove beetles (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) of sandy gravel alluviums of the River Labe between Střekov and Hřensko (Northwestern Bohemia) ....	75
KRÁSENSKÝ P.: False click beetles (Coleoptera: Eucnemidae) of the Pístecký les Nature Reserve (Northwestern Bohemia) .....	105
KRÁSENSKÝ P.: Rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of Březina Nature Reserve (Northwestern Bohemia) .....	113
BENDA P.: Dragonflies (Odonata) of the Československé armády quarry near Most (Northwestern Bohemia)....	131
ROUŠAR A.: Spiders (Araneae) of the Valley of the River Ohře in Northwestern Bohemia .....	140
KRÁSENSKÝ P.: Interesting findings of invertebrates in the Ústí nad Labem region (Northwestern Bohemia) – 2. ....	170

## Brief reports / Kurze Mitteilungen

JOZA V.: The North American panicled willowherb ( <i>Epilobium brachycarpum</i> C. Presl) recently introduced to Northwestern Bohemia .....	196
KRÁSENSKÝ P.: First records of rove beetle <i>Stenus</i> ( <i>Hypostenus</i> ) <i>kiesenwetteri</i> Rosenhauer, 1856 (Coleoptera: Staphylinidae) in Krušné hory Mts. (Northwestern Bohemia) and its current distribution in Bohemia .....	200

## Book reviews / Literaturberichte

Tesaříkovití Ústeckého kraje (P. Krásenský) .....	203
Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy (M. Radoň) .....	205
Porcelanit – hornina v ohni zrozená (P. Dvořák) .....	207
Radovesická výsypka (P. Dvořák) .....	208

## Personalia / Personalien

Miroslav Radoň 50 years old .....	209
The establishment of the Děčín Dendrological Society in 2024 and its public events in 2025 .....	227

# Obsah

## Botanika

JOZA V. & ZDVOŘÁK P.: Zplaňování pavlovnice plstnaté ( <i>Paulownia tomentosa</i> /Thunb./ Steud.) v severozápadních Čechách.....	1
JOZA V.: Zplaňování klejichy hedvábné ( <i>Apocynaceae: Asclepias syriaca</i> ) v severozápadních Čechách .....	10
JOZA V.: Příspěvek ke květeně Mostecká a Litvínovska (severozápadní Čechy) V .....	15
JOZA V. [red.]: Vzácnější pěstované dřeviny severozápadní části Čech (2) .....	31
JOZA V.: Vegetace obnažených den stojatých a tekoucích vod v severozápadních Čechách I. Dobroměřický rybník (Dobroměřice, okres Louny).....	63

## Zoologie

KRÁSENSKÝ P.: Střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) šterkopisčitých náplavů řeky Labe v úseku mezi Střekovem a Hřenskem (severozápadní Čechy).....	75
KRÁSENSKÝ P.: Dřevomilovití brouci (Coleoptera: Eucnemidae) přírodní rezervace Pístecký les (severozápadní Čechy).....	105
KRÁSENSKÝ P.: Drabčíkovití brouci (Coleoptera: Staphylinidae) přírodní rezervace Březina (severozápadní Čechy).....	113
BENDA P.: Vážky (Odonata) povrchového hnědouhelného lomu Československé armády (ČSA) u Mostu (severozápadní Čechy).....	131
ROUŠAR A.: Pavouci (Araneae) údolí řeky Ohře v severozápadních Čechách .....	140
KRÁSENSKÝ P.: Zajímavé nálezy bezobratlých v Ústeckém kraji (severozápadní Čechy) – 2. ....	170

## Krátká sdělení

JOZA V.: Severoamerická vrbovka krátkoplodá ( <i>Epilobium brachycarpum</i> C. Presl) zavlečena také do severozápadních Čech.....	196
KRÁSENSKÝ P.: První nálezy drabčíka <i>Stenus</i> ( <i>Hypostenus</i> ) <i>kiesenwetteri</i> Rosenhauer, 1856 (Coleoptera: Staphylinidae) v Krušných horách (severozápadní Čechy) a jeho aktuální rozšíření v Čechách .....	200

## Recenze a anotace

Tesaříkovití Ústeckého kraje (P. Krásenský).....	203
Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy (M. Radoň) .....	205
Porcelanit – hornina v ohni zrozená (P. Dvořák).....	207
Radovesická výsypka (P. Dvořák).....	208

## Personalia

Miroslav Radoň – 50 let.....	209
Založení Děčínské dendrologické společnosti v roce 2024 a její veřejné akce v roce 2025 .....	227